

**ИНСТРУКЦИЯ**

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

**Эксинта®****Регистрационный номер:** ЛП-007392**Торговое наименование:** Эксинта®**Международное непатентованное или группировочное наименование:** Аминобензойная кислота**Химическое наименование:** 4-аминобензойная кислота**Лекарственная форма:** капли глазные**Состав препарата на 1 мл:***Действующее вещество:*

Аминобензойная кислота 0,07 мг

*Вспомогательные вещества:*

Натрия хлорид 9,0 мг

Натрия гидроксида раствор 1 М до pH 3,5 – 5,0

Вода для инъекций до 1 мл

**Описание**

Прозрачный бесцветный или желтоватый, или коричневатый раствор.

**Фармакотерапевтическая группа**

Противовирусное средство для местного применения.

**Код АТХ:** S03D**Фармакологические свойства****Фармакодинамика**

Аминобензойная кислота является индуктором интерферона, оказывает антиоксидантное, иммуномодулирующее, радиопротекторное действие, ускоряет регенерацию роговицы. Препарат не обладает тератогенным, мутагенным, эмбриотоксическим действием.

**Фармакокинетика**

При инстилляциях в конъюнктивальный мешок аминобензойная кислота быстро всасывается и проявляет терапевтическое действие.

**Показания к применению**В качестве монотерапии и в составе комплексной терапии вирусных поражений глаза: - конъюнктивиты, кератоконъюнктивиты, кератouveиты, вызываемые вирусом герпеса (*herpes simplex*, *herpes zoster*), аденовирусами; - кератопатии инфекционного, посттравматического и послеоперационного генеза.**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к аминобензойной кислоте и вспомогательным веществам.


**Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

До настоящего времени данные клинических испытаний относительно применения препарата во время беременности, лактации, а также у детей отсутствуют. Однако препарат может применяться в том случае, если предполагаемая польза превышает риск.

**Способ применения и дозы**

Препарат закапывают в конъюнктивальный мешок по 1-2 капли 6-8 раз в день.

После клинического выздоровления продолжать инстилляцию по 2 капли 3 раза в день в течение 7 дней.

**Порядок работы с флаконом:**

1. Вращающими движениями против часовой стрелки открыть флакон и снять колпачок.
2. Осторожно, не касаясь пальцами наконечника флакона, перевернуть флакон, зафиксировать между большим и указательным пальцами одной руки.
3. Запрокинуть голову назад, расположить наконечник флакона над глазом и указательным пальцем другой руки оттянуть нижнее веко вниз. Слегка надавить на флакон и закапать необходимое количество препарата в конъюнктивальный мешок глаза. Необходимо избегать контактов наконечника открытого флакона с поверхностью глаза и руками.
4. После использования надеть колпачок на флакон и закрыть вращающими движениями по часовой стрелке.

Порядок работы с флаконом, укомплектованным насадкой-упором для пальцев:



1. Потянув за защитный колпачок вверх, открыть флакон.
2. Осторожно, не касаясь пальцами наконечника флакона, перевернуть флакон и, расположив большой палец одной руки на специальной насадке-упоре, сделать несколько нажатий до появления первой капли.
3. Запрокинуть голову назад, расположить наконечник флакона над глазом и указательным пальцем другой руки оттянуть нижнее веко вниз.
4. Держа большой палец на насадке-упоре, нажать на нее и закапать необходимое количество препарата в конъюнктивальный мешок глаза.  
Необходимо избегать контактов наконечника открытого флакона с поверхностью глаза и руками.
5. После использования надеть колпачок на флакон.

После вскрытия флакона препарат можно использовать в течение 14 дней. По истечении этого срока препарат следует выбросить. При видимых повреждениях флакона применять препарат не следует.

**Побочное действие**

В очень редких случаях наблюдаются конъюнктивальная гиперемия, местные аллергические реакции.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

**Передозировка**

Данные по передозировке препарата отсутствуют.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

В комбинации с аналогами нуклеозидов (ацикловир, ганцикловир и др.), противомикробными средствами (фторхинолоны) и антибиотиками (полимиксин В) усиливается терапевтическое действие этих препаратов. Если Вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные), перед применением препарата проконсультируйтесь с врачом.

**Особые указания**

Не применять препарат одновременно с

сульфаниламидными препаратами и их производными (сульфацил натрия).

Применять препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

**Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами**

Не отмечено.

**Форма выпуска**

Капли глазные 0,007 %.

По 5 мл во флакон с капельницей из полиэтилена низкой плотности и крышкой с контролем первого вскрытия или во флакон-капельницу из полиэтилена высокого давления в комплекте с крышкой навинчиваемой и пробкой-капельницей, или во флакон из полиэтилентерефталата с капельницей пластиковой и крышкой с контролем первого вскрытия, или во флакон из коричневого стекла, укупоренный насадкой медицинской насадкой-упором для пальцев или без него. По 1 флакону из полиэтилена или полиэтилентерефталата в пакете из фольгированной пленки или без него.

По 1 флакону или по 1 пакету из фольгированной пленки с флаконом вместе с инструкцией по применению в пачке из картона.

**Условия хранения**

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

2 года. После вскрытия флакона – 14 дней.

Не применять после окончания срока годности!

**Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

**Владелец регистрационного удостоверения**

ООО «Гротекс»

Россия, 195279, г. Санкт-Петербург

Индустриальный проспект, д. 71, корп. 2, лит. А

Тел.: +7 812 385 47 87

Факс: +7 812 385 47 88

**Производитель/Организация, принимающая претензии**

ООО «Гротекс»

Россия, 195279, г. Санкт-Петербург

Индустриальный проспект, д. 71, корп. 2, лит. А

Тел.: +7 812 385 47 87

Факс: +7 812 385 47 88

[www.solopharm.com](http://www.solopharm.com)